

PREPARO PARA O EXAME DE COLONOSCOPIA QUE SERÁ REALIZADA NO INÍCIO DA MANHÃ (ENTRE 07:00 E 09:45 HORAS)

0- O paciente deverá estar acompanhado por pessoa adulta durante todo o período de realização do exame, inclusive o preparo.

- É importante que **compareça 20 minutos antes** do horário agendado e **assine o termo de consentimento livre e esclarecido** para a realização do exame.

- Caso tenha acima de 70 anos ou se já sofreu algum infarto ou AVC ou tenha perda de função de algum órgão, é necessário o risco cirúrgico.

NO DIA ANTERIOR AO EXAME:

- Evitar líquidos de cor escura.

- Beber muito líquido (pelo menos 03 litros), principalmente água, chá, água de côco, Gatorade® (de cor clara) ou suco da fruta (laranja, limão ou abacaxi) **coado**.

Café da manhã: Biscoitos de água e sal, biscoitos de maisena, biscoito de polvilho, torradas sem manteiga ou margarina, gelatina de cor clara (laranja, limão ou abacaxi) sem pedaços de frutas.

Almoço e jantar (sendo o jantar até às 18 horas): Macarrão instantâneo (**TIPO MIOJO**) com alho e óleo, sem molho **OU** sopa de batata, cenoura, chuchu, abobrinha verde sem casca, **batidos no liquidificador**. Pode ser adicionado peito de frango desfiado, peixe cozido e ovo. Utilizar temperos **sem corantes**.

❖ **ENTRE O ALMOÇO E O JANTAR, CONSUMIR APENAS LÍQUIDOS DE COR CLARA.**

Alimentos proibidos: Carnes vermelhas, cereais integrais (arroz e pão integral, linhaça, aveia), verduras, legumes, frutas (maçã, mamão, maracujá, uva, laranja, tangerina, melão, melancia), leite e derivados (bolo, iogurte), sucos artificiais e bebidas alcoólicas.

13:00 horas: Tomar 03 comprimidos de Dulcolax®.

21:00 horas: Tomar 01 comprimido de Dimenidrinato (Dramin®) ou Metoclopramida (Plasil®) ou Meclin JET (Meclin®)

22:00 horas:

- Diluir 01 frasco de Duphalac® (200 ml) em 800ml de suco de limão (limonada) sem açúcar.
- Acrescentar 01 frasco de Simeticona ou Dimeticona (15ml).

Tomar todo o líquido no período de 22:00 às 23:00 horas (01 copo a cada 10 minutos).

NO DIA DO EXAME:

- Duas horas antes do exame manter jejum absoluto, até mesmo de água.

❖ **ANTES DO JEJUM ABSOLUTO, NÃO INGERIR NENHUM TIPO DE ALIMENTO.**
❖ **É PERMITIDO APENAS LÍQUIDOS DE COR CLARA (DESCRIÇÃO NO INÍCIO DO PREPARO).**

- **Não realizar tarefas que necessitem de atenção e/ou reflexos no dia do exame e nas 12 horas após** a realização do mesmo, tais como: dirigir veículos, pilotar motocicletas, andar como passageiro de motocicletas, praticar atividades físicas, operar máquinas e/ou ferramentas motorizadas, manipular matérias perfuro cortantes, cuidar de crianças, etc.

SOBRE O USO REGULAR DE MEDICAMENTOS

- Suspender por 07 dias, antes da realização da colonoscopia, o uso regular de anti-inflamatórios não hormonais, anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, tais como: Diclofenaco (Cataflan®, Voltarem®, Trandrilax®), Piroxicam (Inflamene®, Feldene®), Celecoxibe (Celebra®), Nimesulida (Nisulid®), Ibuprofeno (Alivium®), Ginkgo biloba, Clopidogrel (Plavix®), Rivaroxabana (Xarelto®), Varfarina (Marevan®), Heparina (Clexane®).

O seu médico clínico deverá ser informado para avaliar a suspensão desses medicamentos.

- No dia do exame, a medicação para diabetes deverá ser tomada somente após a realização do procedimento, para evitar o risco de hipoglicemias pelo fato de estar em jejum.

- Nos dias que antecedem ao exame, tome suas demais medicações de uso contínuo normalmente.

O CANCELAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA.