

PREPARO PARA O EXAME DE COLONOSCOPIA QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE (APÓS 15:00 HORAS)

- O paciente deverá estar **acompanhado por pessoa adulta durante todo o período de realização do exame, inclusive o preparo.**

- É importante que **compareça 20 minutos antes** do horário agendado e **assine o termo de consentimento livre e esclarecido** para a realização do exame.

Caso tenha acima de 70 anos ou se já sofreu algum infarto ou AVC ou tenha perda de função de algum órgão, é necessário o risco cirúrgico.

NO DIA ANTERIOR AO EXAME:

- Evitar líquidos de cor escura.

- Beber muito líquido (pelo menos 03 litros), principalmente água, chá, água de côco, Gatorade® (de cor clara) ou suco da fruta (laranja, limão ou abacaxi) **coado**.

Café da manhã e almoço normal.

Após o almoço: Biscoitos de água e sal, biscoitos de maisena, biscoito de polvilho, torradas sem manteiga ou margarina, gelatina de cor clara (laranja, limão ou abacaxi) sem pedaços de frutas e líquidos de cor clara.

Jantar: Macarrão instantâneo (TIPO MIOJO) com alho e óleo, sem molho **OU** sopa de batata, cenoura, chuchu, abobrinha sem casca, batidos no liquidificador. Pode ser adicionado peito de frango desfiado, peixe cozido e ovo. Utilizar temperos **sem corantes**.

Alimentos proibidos: Carnes vermelhas, cereais integrais (arroz e pão integral, linhaça, aveia), verduras, legumes, frutas (maçã, mamão, maracujá, uva, laranja, tangerina, melão, melancia), leite e derivados (bolo iogurte), sucos artificiais e bebidas alcoólicas.

14:00 horas: Tomar 03 comprimidos de Dulcolax®.

NO DIA DO EXAME:

Café da manhã (até tomar o preparo): Água, chá, água de côco, Gatorade® (de cor clara) ou suco da fruta **coado**.

08:00 horas (manhã): Tomar 01 comprimido de Dimenidrinato (Dramin®) **ou** Metoclopramida (Plasil®) **ou** Meclin JET (Meclin®)

06 horas antes do exame:

- Diluir 01 frasco de Duphalac® (200 ml) em 800ml de suco de limão (limonada) sem açúcar.
- Acrescentar 01 frasco de Simeicona ou Dimeticona (15 ml).
- Tomar todo o líquido no período de 1 hora (01 copo a cada 10 minutos).

- **Dois horas antes do exame manter jejum absoluto, até mesmo de água.**

- ❖ **ANTES DO JEJUM ABSOLUTO, NÃO INGERIR NENHUM TIPO DE ALIMENTO.**
- ❖ **É PERMITIDO APENAS LÍQUIDOS DE COR CLARA (DESCRIÇÃO NO INÍCIO DA FOLHA).**

- **Não realizar tarefas que necessitem de atenção e/ou reflexos no dia do exame e nas 12 horas após** a realização do mesmo, tais como: dirigir veículos, pilotar motocicletas, andar como passageiro de motocicletas, praticar atividades físicas, operar máquinas e/ou ferramentas motorizadas, manipular matérias perfuro cortantes, cuidar de crianças, etc.

SOBRE O USO REGULAR DE MEDICAMENTOS

- Suspender por 07 dias, antes da realização da colonoscopia, o uso regular de anti-inflamatórios não hormonais, anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, tais como: Diclofenaco (Cataflan®, Voltarem®, Trandrilax®), Piroxicam (Inflamene®, Feldene®), Celecoxibe (Celebra®), Nimesulida (Nisulid®), Ibuprofeno (Alivium®), Ginkgo biloba, Clopidogrel (Plavix®), Rivaroxabana (Xarelto®), Varfarina (Marevan®), Heparina (Clexane®).

O seu médico clínico deverá ser informado para avaliar a suspensão desses medicamentos.

- No dia do exame, a medicação para diabetes deverá ser tomada somente após a realização do procedimento, para evitar o risco de hipoglicemia pelo fato de estar em jejum.

- Nos dias que antecedem ao exame, tome suas demais medicações de uso contínuo normalmente.

O CANCELAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA.