

## PREPARO PARA O EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL

### NO DIA DO EXAME:

1. Não precisa estar em jejum.
2. Não há necessidade de suspender medicamentos em uso.
3. **Phosfo enema** (encontrado em drogarias): 1 frasco, aplicar via retal de 2 a 4 horas antes do exame. O paciente deve tentar segurar o conteúdo aplicado por 1 minutos e evacuar em seguida;
4. No caso de pacientes do **sexo feminino, deve realizar o exame fora do período menstrual.**
5. Caso tenha os seguintes exames anteriores, deverá trazer no dia do exame: **Colonoscopia, Enema Opaco, Ultrassonografia Endoanal, Defecografia, Ressonância Nuclear do Assoalho Pélvico ou Manometria Anorretal.**
6. Este exame **não deve ser realizado** no mesmo dia que a Colonoscopia pois os sedativos e o preparo deste exame interferem no resultado.
7. Este exame **pode ser** realizado no mesmo dia que a **Anuscopia**, desde que seja realizado primeiro, pois a Anuscopia interfere no resultado.
8. Caso o paciente tenha realizado exame **radiológico com contraste**, deverá aguardar no mínimo dois dias para realizar a **Manometria Anorretal.**

**O PEDIDO DEVE ESTAR AUTORIZADO PELO PLANO, SE CONVÊNIO.  
O CANCELAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA.**